

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE
USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN
CIENCIAS AGRONÓMICAS.

AZOXYSTRONAGROJ 25 SC

FUNGICIDA – ESTROBIRULINA
AZOXYSTROBIN



PELIGRO

ANTIDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.34 g/cm³

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA
PIEL POR EXPOSICION.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS
Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: AZOXYSTRONAGROJ 25 SC: Este es un fungicida formulado con base en Azoxystrobina, fungicida sistémico, protestante, antiesporulante y curativo del grupo de los metoxiacrílicos. Actúa con dos mecanismos diferentes: primero inhibiendo la síntesis del ergosterol y segundo como inhibidor de la respiración mitocondrial, bloqueando la transferencia de electrones entre citocromo b y citocromo c1, evitando así la formación de ATP. Actúa sobre una amplia translocación y por vía xilema no actúa solamente sobre las partes de los cultivos que reciben la aplicación del producto.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se recomienda su aplicación usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o mecánica). Utilice boquillas de cono hueco, indicadas para fungicidas que produzcan gotas finas y una adecuada cobertura. El personal que manipule este producto deberá utilizar el equipo de protección personal: mascarilla, botas de hule, guantes de hule, lentes, dosificador. Antes de cargar el equipo, cerciorarse de que el mismo este en perfecto estado de funcionamiento, sin escapes de líquidos y debidamente calibrado. Este producto no afecta los equipos de aplicación. Antes y después de ser usado, el equipo debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: Se recomienda hacer una pre-mezcla con la dosis a utilizar, luego llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada el mismo día.



RECOMENDACIONES DE USO:

ENFERMEDADES QUE CONTROLA	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Piricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>
Rizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>
Mancha marrón de la hoja	<i>Helminthosporium oryzae</i>
Mancha marrón lineal	<i>Cercospora oryzae</i>
Escaldado de la hoja	<i>Rhynchosporium oryzae</i>
Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>
Midilu polvoso	<i>Sphaerotheca pannosa</i>
Mancha anillada	<i>Cladosporium echinulatum</i>
Mancha púrpura	<i>Alternaria porri</i>
Roya	<i>Hemileia vastatrix</i>
Mancha foliar	<i>Alternaria dauci</i>
Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>
Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>
Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>

CULTIVOS	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Arroz	<i>Oryza sativa</i>
Banano	<i>Musa sapientum</i>
Plátano	<i>Musa paradisiaca</i>
Cebolla	<i>Allium cepa</i>
Café	<i>Coffea arabica</i>
Habichuela	<i>Phaseolus vulgaris</i>
Maíz	<i>Zea mays</i>
Lechosa	<i>Carica papaya</i>
Zanahoria	<i>Daucus carota</i>
Tomate	<i>Solanum lycopersicum</i>
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>
Ají	<i>Capsicum annuum</i>
Berenjena	<i>Solanum melongena</i>
Rosal	<i>Rosa spp</i>
Clavel	<i>Dianthus spp</i>
Ornamentales, Césped, Pastos y Campos de Golf.	

PH DEL AGUA EN LA MEZCLA: PH: 7.

DOSIS RECOMENDADAS: en banano y plátano, 0.4 a 0.5 litros/ha. Para los demás cultivos, 0.5 a 1.0 litro/ha.

INTERVALO DE APLICACIÓN: En arroz, intervalo de un mes; contra el manchado del grano, realizar una segunda aplicación a los 14 días. En banano y plátano, 7 días. En los demás cultivos, en caso de ser necesaria una segunda aplicación, realizarla con un fungicida de diferente mecanismo de acción, para evitar problemas de resistencia.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: En arroz, 35 días; en banano y plátano, 10 días; en cebolla, 14 días; en café, 15 días; en habichuela, 3 días; en maíz, 15 días; en lechosa, 3 días; en zanahoria, 21 días; en tomate, ají y berenjena, 7 días; en rosas y clavel, sin restricción.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se puede reingresarse al área tratada 12 horas después de aplicado. Si es necesario ingresar antes, debe usarse ropa y equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad para los cultivos que se recomienda, usándolo a la dosis y forma de uso recomendado.

COMPATIBILIDAD: Utilizado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante este producto es compatible y no causa fitotoxicidad en los cultivos para los cuales fue desarrollado, en todas sus fases de desarrollo. Se puede aplicar en mezcla con otros productos agroquímicos de uso común en agricultura, sin embargo, antes de realizar una mezcla por primera vez se recomienda realizar una prueba.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO: Durante el manejo de la mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION: El producto formulado puede ser irritante a la piel y ojos. Si se ingiere puede producir náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y otros síntomas asociados.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: De a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese estos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene antidoto. El tratamiento es sistémico y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL: 809-684-3478 / 3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL: 809-681-2913 / 6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

TOXICO PARA GANADO



TOXICO PARA AVES



TOXICO PARA ABEJAS



TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACIOS.

NO PERSISTENTE EN EL SUELO Y EL AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perforélos y luego deben ser llevados al centro oficial de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y el distribuidor únicamente garantizan la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de su garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones. Este producto se vende sujeto al entendimiento de que el comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten de uso, manejo y aplicación en pérdidas y daños que estén fuera de control del vendedor, como por ejemplo la compatibilidad con otros productos, la manera de su uso o aplicación, la presencia de otros productos o materiales dentro o sobre el suelo o las plantas.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

ANHUI SIDA PESTICIDE CHEMICALS CO., LTD.

Anhui Fine Chemical Park, P. R. China.

EXPORTADO POR:

SHANGHAI BOSMAN INDUSTRIAL CO., LTD.

Room 1804, No.1611, North Sichuan Road, Hongkou District, Shanghai), P. R. China.

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

IMPORTADORA NACIONAL DE AGROQUIMICOS JISECA, S. R. L.

(Dirección: Calle Proyecto 05, Esq. Proyecto 10, Sector Villa Eloisa, Entrada de Brisa, Santo Domingo Este, República Dominicana).

PAIS	NO. REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
REPUBLICA DOMINICANA	7002	14/03/20178

NO. DE LOTE:

FECHA DE FORMULACION:

FECHA DE VENCIMIENTO: