

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

CIPERMETRIN-MAX 25 EC

INSECTICIDA – PIRETROIDE
CYPERMETHRIN



PELIGRO

ANTIDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: Xileno

DENSIDAD: 0.96 g/ml a 20 ° C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: CIPERMETRIN-MAX 25 EC es un insecticida con acción de contacto, estomacal y residual. Al no ser sistémico, se requiere un excelente cubrimiento vegetal para mejorar su eficacia. Actúa a nivel del sistema nervioso, generando una alteración de la transmisión del impulso nervioso. Los piretroides funcionan manteniendo abiertos los canales de sodio en las membranas de las neuronas. Los piretroides afectan tanto el sistema nervioso periférico como el central del insecto.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Se recomienda su aplicación usando equipos terrestres y aéreos solamente para arroz y algodón: el equipo puede ser de espalda manual, de tracción animal o de motor el volumen de aplicación aérea de 12-30 litros/ha. y en aplicación terrestre de 56-560 litro/ha, observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. Después de ser usado, el quipo debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Para preparar el caldo de aplicación: llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua limpia agregue la dosis recomendada del producto y agite: termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada el mismo día. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo.



RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS, EPOCA E INTERVALO DE APLICACION
Arroz <u>Oryza sativa</u>	Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) Gusano cortador, (Agrotis spp) Sogata, (Sogatodes oryzicola) Minador del arroz, (Hydrellia wirthi) Barrenador del tallo del arroz, (Diatrea saccharalis) Novia del arroz, (Rupela albinella)	Aplique de 160 a 350 ml/ha. El volumen de aplicación en aspersión aérea es de 12 a 30 L/ha
Café <u>Coffea arabica</u>	Gusano minador del café, (Perileuoptera coffeella)	Aplique de 150 a 350 ml/ha. Intervalo de aplicación es de 8-15 días según el estado de la población de la plaga.
Tomate <u>Solanum lycopersicum</u>	Gusano del fruto, (Heliothis zea) Gusano alfiler, (Keiferia lycopersicella)	Aplique de 160 a 350 ml/ha. Intervalo de aplicación es de 8-15 días según el estado de la población de la plaga.
Repollo <u>Brassica oleraceavar. capitata</u>	Mariposa del mojuelo (Aporia crataegi) Polilla del repollo, (Plutella xylostella) Gusano medidor, (Trichoplusia ni)	Aplique de 160 a 350 ml/ha. Intervalo de aplicación es de 8-15 días según el estado de la población de la plaga.
Papa <u>Solanum tuberosum</u>	Polilla de la papa, (Phthorimaea operculella)	Aplique de 160 a 350 ml/ha. Cuando el número de polillas en las trampas es mayor de 100, se recomienda aplicar insecticida. Dirigir la aplicación foliar.
Tabaco <u>Nicotiana tabacum</u>	Gusano cornudo, (Manduca sexta). Pulgon del tabaco, (Myzus persicae) Mosca blanca, (Bemisia tabaci)	Aplique de 100 a 150 ml/ha. La aplicación debe dirigirse al follaje. La dosis a aplicar dependerá del desarrollo del cultivo. El intervalo de aplicación depende de la evolución de la población de la plaga.
Maíz <u>Zea mays</u>	Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) Gusano cortador, (Agrotis spp) Perforador de la mazorca, (Heliothis zea) Barrenadores del tallo, (Diatrea saccharalis)	Aplique de 160 a 350 ml/ha. El volumen de aplicación en aspersión aérea es de 12 a 30 L/ha

Ornamentales, Césped, Pastos y Campos de Golf.

PH DEL AGUA EN LA MEZCLA: (ph 4-5 muy estable en soluciones ácidas).

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Tabaco 21 días, Los demás cultivos: 15 días.

INTERVALO DE REINGESO AL AREA TRATADA: Esperar a que el rocío de la aplicación seque. Si es necesario entrar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico usando a la dosis y forma de aplicación recomendado.

COMPATIBILIDAD: La cipermetrina en formulación de concentrado emulsionable, es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de venta en el mercado. Presenta incompatibilidad con sustancias alcalinas. Cuando se vayan a mezclar dos o más productos debe realizarse una prueba de compatibilidad previa a la mezcla de tanque con la finalidad de observar incompatibilidad física y química.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO: Durante el manejo de la mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION: Dolor de cabeza, vértigos, falta de coordinación, espasmos musculares, temblor, náuseas, calambres abdominales, diarrea y sudoración. En casos severos de intoxicación se puede presentar convulsiones y edemas pulmonares.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca la vomito. De a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION:

Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

Lávese estos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No existe antídoto específico. Sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).

TEL: 809-684-3478 / 3672

Hospital Dr.Fco. Moscoso Puello.

TEL: 809-681-2913 / 6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

TOXICO PARA GANADO



TOXICO PARA AVES



TOXICO PARA ABEJAS



TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACIOS.

NO PERSISTENTE EN EL SUELO Y EL AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben perforarlo y depositarlo en un centro de acopio. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, estos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y el distribuidor únicamente garantizan la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de su garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones. Este producto se vende sujeto al entendimiento de que el comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten de uso, manejo y aplicación en pérdidas y daños que estén fuera de control del vendedor, como por ejemplo la compatibilidad con otros productos, la manera de su uso o aplicación, la presencia de otros productos o materiales dentro o sobre el suelo o las plantas.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

YOUJIA CROP PROTECTION CO., LTD.

Addr.: Fifth Tonghai Road, Rudong Coastal Economic Development Zone, Nantong, Jiangsu, China.

EXPORTADO POR:

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.

(Addr: 4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing, P.R. China).

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

IMPORTADORA NACIONAL DE AGROQUIMICOS JISECA, S. R. L

(Dirección: Calle Proyecto 05, Esq. Proyecto 10, Sector Villa Eloisa, Entrada de Brisa, Santo Domingo Este, República Dominicana).

PAIS	NO. REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
REPUBLICA DOMINICANA	6070	15/03/2018

NO. DE LOTE:

FECHA DE FORMULACION:

FECHA DE VENCIMIENTO: