

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE
USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

DIMETHOMORPNAGROJ 80 WG

FUNGICIDA – MORFOLINA

DIMETHOMORPH

ATENCIÓN

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y
A LA PIEL POR EXPOSICION.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS
DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL,
ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: DIMETHOMORPNAGROJ 80 WG es un fungicida local con actividad protectante y antiesporulante previniendo la producción de esporangios y esporas. DIMETHOMORPNAGROJ 80 WG inhibe la formación de la pared celular desencadenando la muerte del hongo.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Puede usarse en pulverizadores de mochila o cualquier otro tipo de equipo apropiado para aspersión de herbicidas que asegure una distribución uniforme. Terminado el uso se debe lavar muy bien con agua y jabón abundante. Utilice boquillas de abanico plano y use equipo de protección personal durante el manejo y uso de este producto. Antes y después de ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:

ENFERMEDADES QUE CONTROLA:	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Moho azul	<i>Peronospora tabacina</i>
Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>
Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>
Tizón del arroz	<i>Pyricularia oryzae</i>
Mildiu de las cucurbitáceas	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>
Helmintosporiosis	<i>Helminthosporium oryzae</i>

CULTIVOS:	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Arroz	<i>Oryza sativa</i>
Tabaco	<i>Nicotiana tabacum</i>
Tomate	<i>Solanum lycopersicum</i>
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>
Cebolla	<i>Allium cepa</i>
Melón	<i>Cucumis melo</i>
Pepino	<i>Cucumis sativus</i>
Sandia	<i>Citrullus vulgaris</i>

PH DEL AGUA EN LA MEZCLA: PH 5.0 – 9.0

DOSIS RECOMENDADA: 1.5-2 kg/ha.

EPOCA DE APLICACIÓN: efectuar las aplicaciones en forma preventiva o cuando aparezcan los primeros síntomas.

INTERVALO DE APLICACIÓN: realizar de 3 a 4 aplicaciones con intervalo de 7 a 15 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 21 Días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Espere que el rocío de la aplicación haya secado, como mínimo esperar 24 horas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se usa en la forma y dosis recomendadas. Ciertas variedades de caña pueden mostrar clorosis inicial, que luego desaparece.

COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con la mayoría de los pesticidas, pero siempre es conveniente hacer pruebas de compatibilidad antes de mezclarlo con otros productos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO: Durante el manejo de la mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y

utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION: la sobreexposición a los herbicidas de la triazina pueden inducir fatiga, vértigos, náuseas, vómitos, diarrea, convulsiones, irritación de la piel, los ojos, y zona respiratoria, debilidad muscular, eczema alérgica o asma.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: De a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese estos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: No tiene antídoto, El tratamiento médico consiste:

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL: 809-684-3478 / 3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL: 809-681-2913 / 6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

TOXICO PARA GANADO



TOXICO PARA AVES



TOXICO PARA ABEJAS



TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACIOS.

NO PERSISTENTE EN EL SUELO Y EL AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos perforarse y luego depositados en un centro de acopio autorizado por las autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y el distribuidor únicamente garantizan la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de su garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones. Este producto se vende sujeto al entendimiento de que el comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten de uso, manejo y aplicación en pérdidas y daños que estén fuera de control del vendedor, como por ejemplo la compatibilidad con otros productos, la manera de su uso o aplicación, la presencia de otros productos o materiales dentro o sobre el suelo o las plantas.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR: HEBEI GUANLONG AGROCHEMICAL CO., LTD.

(Dirección: No. 8 Weiwu Street Hengshui New Industrial Park,
Hebei, Province, China)

EXPORTADO POR:

SHANGHAI SINO GREATLAND INDUSTRIAL CO., LTD

(Dirección: Rm 1103, No.211, Jingang RD Free Trade Zone Shanghai,
China)

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: IMPORTADORA NACIONAL DE AGROQUIMICOS JISECA, S. R. L.

(Dirección: Calle Proyecto 05, Esq. Proyecto 10, Sector Villa Eloísa,
Entrada de Brisa, Santo Domingo Este, República Dominicana).

PAIS	NO. REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
REPUBLICA DOMINICANA	8836	27/09/2023

NO. DE LOTE:
FECHA DE FORMULACION:
FECHA DE VENCIMIENTO: