

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE
USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

FIPRONAGROJ 50 SC

INSECTICIDA – FENILPIRAZOL

FIPRONIL



PELIGRO

ANTIDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.48 g/cm³

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE
INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICION.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS.



USO AGRONOMICO

MODO Y MECANISMO DE ACCION: FIPRONAGROJ 50 SC:
insecticida de contacto e ingestión que actúa en el sistema nervioso del
insecto a nivel de ácido gama aminobutírico sobre los iones cloro, en el
sistema nervioso central. No tiene efecto sobre la acetilcolinesterasa por lo
que resulta activo sobre insectos resistentes a los carbamatos, ciclodieno y
piretroides.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Debe usarse guantes, botas,
mascarillas, anteojos, y overol de mangas largas. Se recomienda
usar aspersora de mochila o equipo acondicionado por tractor o
aplicarse mediante el sistema de riego por goteo, según el tipo de
aplicación. Deberá asegurarse que el equipo de aspersión este en
buenas condiciones de funcionamiento, que no tenga derrames y
que los filtros estén limpios. Debe contarse con dosificadores,
cepillos para limpiar boquillas. Para aplicaciones terrestres use de
200 a 400 litros de agua por hectárea.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua,
agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con
agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación
incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda
ser aplicada el mismo día. Después de utilizar el equipo de aspersión
lávelo con suficiente agua y jabón.



RECOMENDACIONES DE USO:

PLAGAS QUE CONTROLA	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Sogata	<i>Tagosodes orizicolus</i>
Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia spp.</i>
Picudo de la raíz del arroz	<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>
Picudo negro del plátano	<i>Cosmopolites sordidus</i>
Chinche de encaje	<i>Leptodictia spp.</i>
Cochinilla harinosa	<i>Pseudococcus elisae</i>
Afido del algodón	<i>Aphis gossypii</i>
Trípido de las flores	<i>Frankliniella insularis</i>
Trípido pequeño del guineo	<i>Frankliniella parvula</i>
Gusano alambre	<i>Agriotes spp.</i>
Piojo blanco de la cabellera	<i>Geococcus spp.</i>
Mosca negra de la naranja	<i>Aleurocanthus spp.</i>
Gallina ciega	<i>Phyllophaga spp.</i>
Escamas	<i>Lepidosaphes spp.</i>
Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>
Pulgon verde	<i>Myzus persicae</i>
Chicharrita	<i>Empoasca spp.</i>
Trips	<i>Thrips palmi</i>
Mosca de la fruta	<i>Anastrepha suspensa</i>
Mosca del mediterráneo	<i>Ceratitis capitata</i>
Mosca negra de los cítricos	<i>Aleurocanthus woglumi</i>
Termita	<i>Heterotermes spp.</i>
Trípido de la flor	<i>Frankliniella cephalica</i>
Trips de la faja roja	<i>Selenothrips rubrocinctus</i>
Cochinilla algodonosa	<i>Planococcus citri</i>
Escama Hemisférica	<i>Saissetia spp.</i>
Escama harinosa	<i>Pseudococcus adonidum</i>
Picudo de los cítricos	<i>Exophthalmus hieroglyphicus</i>
Polilla	<i>Plutella xylostella</i>
Minador de las hojas	<i>Liriomyza spp.</i>
Trips del melón	<i>Thrips palmi</i>
Trips de la cebolla	<i>Thrips tabaci</i>
Mosca blanca	<i>Bemisia spp.</i>
Pulgones	<i>Aphis spp.</i>

CULTIVOS	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Arroz	<i>Oryza sativa</i>
Plátano	<i>Musa paradisiaca</i>
Banano	<i>Musa sapientum</i>
Cítricos	<i>Citrus spp.</i>
Lechosa	<i>Carica papaya</i>
Mango	<i>Mangifera indica</i>
Aguacate	<i>Persea americana</i>
Cebolla	<i>Allium cepa</i>
Ajo	<i>Allium sativum</i>
Algodón	<i>Gossypium hirsutum</i>
Apio	<i>Apium graveolens</i>
Melón	<i>Cucumis melo</i>
Pepino	<i>Cucumis sativus</i>
Sandia	<i>Citrullus lanatus</i>
Auyama	<i>Cucurbita moschata</i>
Lechuga	<i>Latuca sativa</i>
Fresa	<i>Fragaria vesca</i>
Frijoles	<i>Phaseolus spp.</i>
Maíz	<i>Zea mays</i>
Tomate	<i>Solanum lycopersicum</i>
Pimiento	<i>Capsicum annum</i>
Ornamentales, Césped, Pastos y Campos de Golf.	

PH DEL AGUA EN LA MEZCLA: PH: 5.0 – 7.0.

DOSIS RECOMENDADA: 1.0 l/ha.

EPOCA DE APLICACIÓN: realizar monitoreo, aplicar el producto
cuando se observen los primeros signos de ataque de plagas.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: la frecuencia de la aplicación dependerá de la re infestación de las plagas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 21 días.

INTERVALO DE REINGESO AL AREA TRATADA: Hasta pasadas las 3 horas después de la aplicación tanto para humanos como para animales.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos que se recomienda, si es utilizado de acuerdo a la dosis y modos de aplicación.

COMPATIBILIDAD: compatible con fertilizantes o plaguicidas, incluyendo los herbicidas. Sin embargo, no debe mezclarse con ningún producto de fuerte reacción alcalina, como cal ó amoníaco anhidro, ya que el ingrediente activo puede degradarse. En caso de que sea necesario mezclar este producto, se debe hacer solamente con productos autorizados. No obstante en caso de dudas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad en pequeñas áreas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO: Durante el manejo de la mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION: Algunos síntomas de intoxicación son: ataxia (descoordinación de los movimientos), hipermetría (movimiento desmesurado), desorientación, hiperestesia (Reacción exagerada a los estímulos táctiles), temblores, midriasis (dilatación de la pupila), depresión, ceguera y coma.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca la vomito. Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese estos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sistemático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL: 809-684-3478 / 3672
Hospital Dr.Fco. Moscoso Puello.
TEL: 809-681-2913 / 6922.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

TOXICO PARA GANADO



TOXICO PARA AVES



TOXICO PARA ABEJAS



TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACIOS.

NO PERSISTENTE EN EL SUELO Y EL AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perfórelos y luego deben ser llevados al centro oficial de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y el distribuidor únicamente garantizan la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de su garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones. Este producto se vende sujeto al entendimiento de que el comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten de uso, manejo y aplicación en pérdidas y daños que estén fuera de control del vendedor, como por ejemplo la compatibilidad con otros productos, la manera de su uso o aplicación, la presencia de otros productos o materiales dentro o sobre el suelo o las plantas.

**FABRICADO Y/O FORMULADO POR:
JIANGSU TUOQIU AGROCHEMICALS CO., LTD.**

Dirección: Kaitai Road, Coastal Industrial Park, Jiangsu Binhai Economic and Development Zone, P.R. China.

**EXPORTADO POR:
SHANGHAI SINOGREATLAND INDUSTRIAL CO., LTD.**

ADD:Room 1102, Block A, Building 2, Senlan Meilun Plaza, No. 555 Lansong Rd, Pudong, Shanghai, China.

**REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
IMPORTADORA NACIONAL DE AGROQUIMICOS JISECA, S. R. L.**

(Dirección: Calle Proyecto 05, Esq. Proyecto 10, Sector Villa Eloísa, Entrada de Brisa, Santo Domingo Este, República Dominicana).

PAIS	NO. REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
REPUBLICA DOMINICANA		

**NO. DE LOTE:
FECHA DE FORMULACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:**