

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE  
USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN  
CIENCIAS AGRONÓMICAS.

# QUEMAZÓN 35.6 SL

HERBICIDA-FOSFONICO  
GLYPHOSATE

**ATENCIÓN**  
**ANTIDOTO: NO TIENE**  
**DENSIDAD: 1.19 g/ml a 20°C**

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE  
Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A  
LA PIEL POR EXPOSICION.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS  
DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL,  
ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



**USO AGRONOMICO: HERBICIDA.**

**MODO Y MECANISMO DE ACCION: QUEMAZÓN 35.6 SL**  
es un herbicida sistémico, no selectivo, para ser aplicado en forma  
dirigida sobre el follaje de malezas anuales o perennes, tanto  
gramíneas como de hoja ancha con menos de 50 cms de altura y  
algunas ciperáceas, en plantaciones de café, plátano, guineo,  
algodón, palma aceitera y frutales en general. También se  
recomienda el control en general de malezas en áreas no cultivadas.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Puede usarse en pulverizadores de  
mochila o cualquier otro tipo de equipo apropiado para aspersión de  
herbicidas que asegure una distribución uniforme. Terminado el uso  
se debe lavar muy bien con agua y jabón abundante. Utilice  
boquillas de abanico plano y use equipo de protección personal  
durante el manejo y uso de este producto. Antes y después de ser  
usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser lavados  
cuidadosamente con agua y jabón.



**FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:** Llene el  
tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue  
la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con  
agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la  
agitación incluso durante la aplicación.



## RECOMENDACIONES DE USO:

| MALEZAS QUE CONTROLA |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| NOMBRE COMUN         | NOMBRE CIENTIFICO                  |
| Pata de gallina      | <i>Eleusine indica</i>             |
| Cadillo              | <i>Cenchrus echinatus</i>          |
| Yerba de agua        | <i>Ixophorus spp</i>               |
| Plumilla             | <i>Leptochloa filiformis</i>       |
| Quita parcela        | <i>Echinochloa crus-galli</i>      |
| Arrocillo            | <i>Echinochloa colona</i>          |
| Coquillo             | <i>Cyperus ferax</i>               |
| Caminadora           | <i>Rottboellia cochinchinensis</i> |
| Pasto bermuda        | <i>Cynodon dactylon</i>            |
| Bledo                | <i>Amaranthus spp</i>              |
| Verdolaga            | <i>Portulaca oleracea</i>          |
| Amor seco            | <i>Bidens pilosa</i>               |
| Suelda con suelda    | <i>Commelina diffusa</i>           |
| Kikuyo               | <i>Pennisetum clandestinum</i>     |
| Estrella             | <i>Cynodon plectostachyus</i>      |
| Hierba buena         | <i>Mitracarpus spp.</i>            |

| CULTIVOS                                                                |                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE COMUN                                                            | NOMBRE CIENTIFICO             | DOSIS RECOMENDADA                                                                                                                                                                           |
| Aguacate                                                                | <i>Persea americana</i>       | De 1-3 litros por hectárea, hacer las aplicaciones cuando las plantas tengan entre 15-30 centímetros de altura y estén metabólicamente activas, con un volumen de mezcla de 100-400 litros. |
| Café                                                                    | <i>Coffea arabica</i>         |                                                                                                                                                                                             |
| Macadamia                                                               | <i>Macadamia integrifolia</i> |                                                                                                                                                                                             |
| Banano                                                                  | <i>Musa sapientum</i>         |                                                                                                                                                                                             |
| Plátano                                                                 | <i>Musa paradisiaca</i>       |                                                                                                                                                                                             |
| Caña de azúcar                                                          | <i>Saccharum officinarum</i>  |                                                                                                                                                                                             |
| Hule                                                                    | <i>Hevea brasiliensis</i>     |                                                                                                                                                                                             |
| Soya                                                                    | <i>Glycine max</i>            |                                                                                                                                                                                             |
| Piña                                                                    | <i>Ananas comosus</i>         |                                                                                                                                                                                             |
| Maíz                                                                    | <i>Zea mays</i>               |                                                                                                                                                                                             |
| Guayaba                                                                 | <i>Psidium guajava</i>        |                                                                                                                                                                                             |
| Coco                                                                    | <i>Cocos nucifera</i>         |                                                                                                                                                                                             |
| Mango                                                                   | <i>Mangifera indica</i>       |                                                                                                                                                                                             |
| Cajuil                                                                  | <i>Anacardium occidentale</i> |                                                                                                                                                                                             |
| Cacao                                                                   | <i>Theobroma cacao</i>        |                                                                                                                                                                                             |
| Lechosa                                                                 | <i>Carica papaya</i>          |                                                                                                                                                                                             |
| Cítricos                                                                | <i>Citrus spp</i>             |                                                                                                                                                                                             |
| APLICACIÓN PRE- SIEMBRA                                                 |                               |                                                                                                                                                                                             |
| Arroz                                                                   | <i>Oryza sativa</i>           | De 3-4 litros por hectárea en 30 a 150 litros de agua, dependiendo del tamaño de las malezas (20-40 cm de altura)                                                                           |
| Algodón                                                                 | <i>Gossypium barbadense</i>   |                                                                                                                                                                                             |
| Melón                                                                   | <i>Cucumis melo</i>           |                                                                                                                                                                                             |
| Maíz                                                                    | <i>Zea mays</i>               |                                                                                                                                                                                             |
| Sorgo                                                                   | <i>Sorghum bicolor</i>        |                                                                                                                                                                                             |
| Otros usos: en canales de riego, bordes de los campos y solares baldíos |                               |                                                                                                                                                                                             |

**PH DEL AGUA EN LA MEZCLA:** PH: 3.5 es su óptima efectividad.

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** Las malezas anuales son más susceptibles al producto en las fases tempranas de desarrollo. Malezas más desarrolladas requieren de mayor dosis para su control. Las malezas perennes son más susceptibles entre la fase desfloración temprana y la maduración. En general se requiere de 6 a 8 hojas para la mayor absorción y translocación del herbicida y sus efectos se empiezan a notar entre los 4 y 6 días en las malezas anuales entre 8 y 10 días en las malezas perennes.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:** Toda aplicación debe pararse 21 días antes de la cosecha.

**INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:** Se puede ingresar a la plantación 24 horas después de la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico, utilizado a las dosis y épocas recomendadas.

**COMPATIBILIDAD:** Quemazón 35.6 SL es compatible con otros herbicidas como 2,4-D, Dicamba, Diuron, Oxifluorfen, Alaclor, Atrazina, Linuron, Metribuzin.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:** Durante el manejo de la mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



**UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.**



**NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



**SINTOMAS DE INTOXICACION:** Irritación y enrojecimiento de los ojos, picazón y enrojecimiento de las membranas mucosas, náuseas y malestar estomacal.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**EN CASO DE INGESTION:** De a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

**EN CASO DE INHALACION:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese estos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:**  
No tiene. El tratamiento es sistémico y de sostén.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:**  
Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).  
TEL: 809-684-3478 / 3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.  
TEL: 809-681-2913 / 6922

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:**

**TOXICO PARA GANADO**



**TOXICO PARA AVES**



**TOXICO PARA ABEJAS**



**TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.**



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACIOS.**

**NO PERSISTENTE EN EL SUELO Y EL AGUA.**

**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.**

**RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.**

**ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:** Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perforélos y luego deben ser llevados al centro oficial de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTIA:** El fabricante y el distribuidor únicamente garantizan la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de su garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones. Este producto se vende sujeto al entendimiento de que el comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten de uso, manejo y aplicación en pérdidas y daños que estén fuera de control del vendedor, como por ejemplo la compatibilidad con otros productos, la manera de su uso o aplicación, la presencia de otros productos o materiales dentro o sobre el suelo o las plantas.

**FABRICADO Y/O FORMULADO POR:**  
**HEFEI YIFENG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD**

(Dirección: The North Side of 4TH Latitude Road, Circular Economy  
Demonstration Garden of Hefei. Anhui Province, China).

**EXPORTADO POR:**  
**SHANGAI AGROCHINA CHEMICAL CO., LTD.**

(Dirección: 26 TH Floor, No. 828-838 Zhangyang Road, Pilot Free Trade Zone,  
Shanghai, China.).

**REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**  
**IMPORTADORA NACIONAL DE AGROQUIMICOS JISECA, S. R. L.**  
(Dirección: Calle Proyecto 05, Esq. Proyecto 10. Sector Villa Eloísa, Entrada de Brisa,  
Santo Domingo Este, República Dominicana).

| PAIS                    | NO. REGISTRO | FECHA DE REGISTRO |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| REPUBLICA<br>DOMINICANA | 4937         | 05/10/2015        |

**NO. DE LOTE:**  
**FECHA DE FORMULACION:**  
**FECHA DE VENCIMIENTO:**