

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

TERBUTRIMAX 50 SC

HERBICIDA –TRIAZINA
TERBUTRYN



PELIGRO

ANTIDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,080 g/mL a 20 °C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: TERBUTRIMAX 50 SC es un herbicida a base de terbutrina que actúa a nivel radicular y también es absorbido por el follaje, con traslocación acropétala a través del xilema y se acumula en los puntos de crecimiento inhibiendo los meristemas apicales.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Puede usarse en pulverizadores de mochila o cualquier otro tipo de equipo apropiado para aspersión de herbicidas que asegure una distribución uniforme. Terminado el uso se debe lavar muy bien con agua y jabón abundante. Utilice boquillas de abanico plano y use equipo de protección personal durante el manejo y uso de este producto. Antes y después de ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO: MALEZAS QUE CONTROLA

Nombre Común	Nombre Científico
Caminadora	<i>Rottboellia spp.</i>
Cloris	<i>Chloris inflata</i>
Pie de Gallo	<i>Echinochloa colonum</i>
Tumba Crédito	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Pata de Gallina	<i>Eleusine indica</i>
Pata de Cotorra	<i>Digitaria sanguinalis</i>
Gramalote	<i>Panicum fasciculatum</i>
Cadillo	<i>Cenchrus equinatus</i>
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>
Bledo	<i>Amaranthus spp.</i>
Botoncito	<i>Chenopodium album</i>
Batatilla	<i>Ipomoea spp.</i>

CULTIVOS

Nombre Común	Nombre Científico
Caña de Azúcar	<i>Saccharum officinarum</i>
Maíz	<i>Zea mays</i>
Sorgo	<i>Sorghum vulgare</i>
Habichuela	<i>Phaseolus vulgaris</i>

PH DEL AGUA EN LA MEZCLA: PH: 6-8

DOSIS RECOMENDADAS: 3 – 7 lt/ha

INTERVALO DE APLICACIÓN: Aplica al inicio de la siembra. Para caña de azúcar, maíz, habichuela: En pre-emergencia. Para sorgo: post emergencia.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: No existe restricción, dependerá del desarrollo de las malezas y de las condiciones climáticas.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Esperar a que se seque el rocío de la aplicación. Si es necesario entrar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y en las dosis recomendadas. Recordar que este herbicida es fitotóxico para mono y dicotiledóneas.

COMPATIBILIDAD: TERBUTRIMAX 50 SC Es compatible con los herbicidas post-emergentes utilizados en el cultivo de caña.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO: Durante el manejo de la mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION: Causa irritación de ojos, nariz, garganta y piel. Al ingerirlo puede causar gastroenteritis, náusea, vómitos, diarrea, taquicardia, convulsiones y acidosis.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: De a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese estos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:
No tiene. El tratamiento es sistémico y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:
Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL: 809-684-3478 / 3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL: 809-681-2913 / 6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

TOXICO PARA GANADO



TOXICO PARA AVES



TOXICO PARA ABEJAS



TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACIOS.

NO PERSISTENTE EN EL SUELO Y EL AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perfórelos y luego deben ser llevados al centro oficial de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y el distribuidor únicamente garantizan la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de su garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones. Este producto se vende sujeto al entendimiento de que el comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que resulten de uso, manejo y aplicación en pérdidas y daños que estén fuera de control del vendedor, como por ejemplo la compatibilidad con otros productos, la manera de su uso o aplicación, la presencia de otros productos o materiales dentro o sobre el suelo o las plantas.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:
ZHEJIANG ZHONGSHAN CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.
Zhongshan, Xiaopu, Changxing ,Zhejiang, China

EXPORTADO POR:
NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.
(Add: 4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing, P.R. China).

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
IMPORTADORA NACIONAL DE AGROQUIMICOS JISECA, S. R. L.
(Dirección: Calle Proyecto 05, Esq. Proyecto 10, Sector Villa Eloísa, Entrada de Brisa, Santo Domingo Este, República Dominicana).

PAIS	NO. REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
REPUBLICA DOMINICANA	9103	07/08/2024

NO. DE LOTE: 20240815
FECHA DE FORMULACION: 15/08/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2026